



Marlies Linting®
permanente make up

Aanvullende informatie Informed Consent

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en stel de PMU-specialist op de hoogte indien u twijfelt aan uw geschiktheid om te worden behandeld.

(Semi) permanente make-up en het genezingsproces kunnen gepaard gaan met risico's en mogelijke complicaties. Zorg daarom dat u goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. U krijgt aanwijzingen over nazorg om u te helpen de effecten te minimaliseren. Het is normaal dat het aanbrengen van permanente make-up gepaard gaat met pijn, roodheid en zwellingen. Als deze symptomen tijdens het genezingsproces verergeren, kan dit een teken van een infectie zijn en zou u een arts moeten raadplegen. Stel de SPMU-specialist op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen, allergieën, epilepsie en overgevoeligheidsreacties. En controleer op www.veiligtatotoeerenenpiercen.nl dat de praktijk waar u een PMU wilt laten zetten een vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de praktijk werkt volgens de eisen uit de Europese norm (NEN-EN 17169) en de toelichting op de norm.

Laat geen PMU aanbrengen:

- huiddelen die onderworpen zijn geweest aan plastische chirurgie of radiotherapie met inbegrip van recente littekens en keloïden (blijkens medisch advies);
- op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
- op een plek waar minder dan vier weken geleden SPMU is gezet;
- op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tattoo of SPMU is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
- op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
- op huidziekten die actief zijn (bijvoorbeeld eczeem, psoriasis)
- op een moedervlek of een litteken dat is overgebleven na het verwijderen van een melanoom.
- als u onder invloed bent van alcohol of drugs;
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Daarnaast wordt het afgeraden om PMU te laten zetten als u last heeft van één van de volgende aandoeningen:

- hemofilie;
- chronische huidziekte;
- allergie voor tattoo materialen of -inkt;
- immuunstoornis;

Heeft u één van deze aandoeningen of gebruikt u antistollingsmiddelen, bloeddrukverlagende middelen of antibiotica? En wilt u toch PMU? Overleg dan eerst de mogelijkheden met een arts.

Het zetten van (semi) permanente make-up (PMU)

Omdat er tijdens het zetten van PMU een wond ontstaat, is er een kans op besmetting van ziekten die via bloed worden overgedragen, zoals hepatitis B en C. Controleer daarom of de specialiste hygiënisch werkt. Een hygiënische werkwijze is ook belangrijk om te voorkomen dat uw nieuwe SPMU gaat ontsteken. Let er in ieder geval op dat:


- de huid voor het zetten van PMU wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd;
- de naalden en inkt steriel zijn verpakt en alleen voor u worden gebruikt;
- tijdens het zetten van PMU schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
- de specialist tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt;

Nazorg

Nieuwe PMU is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënische behandeling kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooi PMU resultaat leiden. Als u de PMU goed verzorgt, duurt het twee tot zes weken tot de wond genezen is. De specialist geeft schriftelijke uitleg over de nazorg van PMU. Lees dit goed door.

Voor vragen kunt u contact opnemen via:

 info@marlieslinting.nl

 06-2015 2039

 van Limburg Stirumstraat 3, 1272EN Huizen